

Почему у ребенка текут слюни?


Обильное слюноотделение (гиперсаливация) может быть, как нормой, так и не нормой.

В каком случае это временное явление, которое само скоро пройдет?

Если у ребенка текут слюни из-за прорезывания зубов. Начаться это может заранее, за 1-3 месяца до прорезывания зуба, пока его даже и не видно. Причем слюна может даже стекать по подбородку и капать на пол. В случае с зубами - это норма. Прекратиться такое слюноотделение должно к моменту прорезывания зуба. Появился зуб - текущей слюны нет. У детей в 3-4-месячном возрасте слюна также часто вытекает изо рта. Это происходит из-за незрелости контроля слюноотделения и заглатывания слюны.



РЕГУЛЯЦИЯ СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ



А какие нарушения вызывают обильное слюноотечение?

1. Патология слизистой полости рта: например, молочница, стоматиты; вирусные заболевания, которые поражают сами слюнные железы (вирусный сиалоаденит); так называемая ложная гиперсаливация, когда количество слюны остается в норме, а вытекание происходит из-за болевого синдрома, связанного с вышеперечисленными состояниями.

2. Патология нервной системы (ДЦП, опухоли головного мозга, энцефалиты, псевдобульбарный синдром (поражение черепных нервов) и др.).

3. Проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта (гастрит, энтерит и др.).

4. Отравление ядами, барбитуратами, ртутью, свинцом и др.



Каких врачей нужно пройти?

Гастроэнтеролога, невролога, стоматолога и сдать анализ кала. Если слюнотечение вызвано слабыми жевательными мышцами (на щеках), круговой мышцей рта (при дизартрии), то может помочь следующее:

1. Грызть сухари, сушки, морковь, мясо. Все твердое, чтобы натренировать жевательные мышцы.

2. Напоминаем сглатывать слюну.

3. Если ребенок не чувствует, когда у него течет слюна - формируем ощущение сухого и мокрого подбородка; повышаем чувствительность области рта.

4. Криотерапия (прикладывание льда). Без наблюдения у специалиста этим лучше не увлекаться.

5. Полоскание рта травами

6. Логопедический массаж лица (перед проведением необходимо обследоваться у невролога; сделать ЭЭГ чтобы определить, нет ли ЭПИ-активности).

7. Выполнять специальные упражнения для укрепления мышц щек, губ, языка.

С уважением, учитель-логопед:

С.Г. Коротышева

